


## Preferred Provider Check

De Preferred Provider Check wordt gebruikt om in één oogopslag te kunnen zien hoe FysioRoadmap over een langere periode in de praktijk wordt gebruikt.


Ga naar het tabblad "Statistiek en Overzichten" en dan "Preferred Provider Check". Het volgende scherm verschijnt:



The screenshot shows a window titled "Preferred Provider Check" with the following fields and options:

- Instituut: Demo Instituut (dropdown menu)
- Fysiotherapeut: Fysiotherapeut, Test (dropdown menu with search icon)
- Periode: 1- 1 -2009 t/m 1- 2 -2010 (date range dropdowns)
- Criteria eerste jaar (selected radio button)
- Criteria tweede en volgende jaren (unselected radio button)
- Bereken button
- Open button


Kies het instituut en indien gewenst, de fysiotherapeut en de periode. Druk daarna op "Bereken".




### Uitleg resultaten Anamnesekaart:

Norm: 80%. Criteria tweede jaar of verder (ooit vastgesteld door een groep FysioRoadmap gebruikers).

Resultaat: 90%. 308 van totaal 343 patiënten hebben een voldoende anamnesekaart. Dit is 90%, en meer dan de vereiste 80% en daarom voldoende (groen).

Kies  om de lijst met patiënten te bekijken.



Preferred Provider Check

Anamnesekaart:

Fysiotherapeut: Alle fysiotherapeuten

Periode: 1-1-2009 t/m 31-12-2009

ID	Naam patiënt	Fysiotherapeut	Indicatie	Archief
4	Oud B, Piet	Fysiotherapeut, Test	Enkel: Status AP ruptuur chirurgische reconstructie	
13	Haag, Dan	Fysiotherapeut, Test	Knie: Status na Total Knee	
12	Easton, Jim	Fysiotherapeut, Test	Heup: Total Hip Post-Klinische Fase	
4	Oud B, Piet	Fysiotherapeut, Test		
6	Test, Patient	Fysiotherapeut, Test	Heup: Total Hip Post-Klinische Fase	
12	Easton, Jim	Fysiotherapeut, Test		
15	CZ, Piet	Fysiotherapeut, Test	Schouder: Status na Neer plastiek	
6	Test, Patient	Fysiotherapeut, Test	Schouder: Tendinitisbeeld	
6	Test, Patient	Fysiotherapeut, Test	Algemeen: CVA	
18	Swiss, German	Fysiotherapeut, Test	Elleboog: Epicondylitis lateralis lokaal type II-IV	
21	Eas, Jim	Fysiotherapeut, Test	Enkel: Status na inversietrauma	
34	Heemstede, Piet	Fysiotherapeut (e),	CWK: Cervicobrachialgie	
17	Mookus, Jim	Fysiotherapeut, Test	Heup: Total Hip Post-Klinische Fase	
36	Loes, Rijssen	Fysiotherapeut, Test	Heup: Myalgische klachten	
22	Erqo, Piet	Easton, Jim	CWK: Artrose	

Print

Annuleren

Sluiten

U vindt hier een overzicht van alle aangemaakte anamnesekaarten in de door u aangegeven periode. Rode anamnesekaarten zijn onvoldoende, groene anamnesekaarten zijn voldoende. Dubbelklik op de naam om naar de desbetreffende patiënt in FysioRoadmap toe te gaan. Kies 'Print' om de lijst uit te printen, u kunt dan kiezen of u alleen de rode patiënten wilt uitprinten.

## De totale selectie van de Preferred Provider Check wordt gemaakt volgens de volgende voorwaarden:

### Anamnesekaarten

Voor de berekening van de juiste anamnesekaarten, worden alle anamnesekaarten geselecteerd waarbij:

- In de anamnesekaart, het tabblad "Analyse", het vinkje bij 'Indicatie fysiotherapie' "Ja" is aangevinkt.
- De behandelkeuze gelijk is aan:
  - Consult - In behandeling
  - DTF - In behandeling
  - Fysiotherapie intake na verwijzing
  - Kinderfysiotherapie
  - Bekkenfysiotherapie
  - Directe Toegankelijkheid Bekkenfysiotherapie - In behandeling
- De anamnesekaart is aangemaakt op/tussen de data die geselecteerd zijn bij periode.
- Optioneel: De anamnesekaart is aangemaakt door de geselecteerde fysiotherapeut

De anamnesekaart wordt voldoende bevonden als alle 'Automatische Quality Check' velden in de anamnesekaart groen zijn.

## Behandelprotocol

Voor de berekening van de juiste protocollen, worden alle anamnesekaarten geselecteerd waarbij:

- In de anamnesekaart, het tabblad "Analyse", het vinkje bij 'Indicatie fysiotherapie' "Ja" is aangevinkt.
- De behandelkeuze gelijk is aan:
  - Consult - In behandeling
  - DTF - In behandeling
  - Fysiotherapie intake na verwijzing
  - Kinderfysiotherapie
  - Bekkenfysiotherapie
  - Directe Toegankelijkheid Bekkenfysiotherapie - In behandeling
- De anamnesekaart is aangemaakt op/tussen de data die geselecteerd zijn bij periode
- Optioneel: De anamnesekaart is aangemaakt door de geselecteerde fysiotherapeut

Voor elke anamnesekaart waarin een protocol gekozen is, is het resultaat voldoende.

## Tussentijdse- en Eindrapportages

Voor de berekening van de juiste rapportages, worden alle anamnesekaarten geselecteerd waarbij:

- In de anamnesekaart, het tabblad "Analyse", het vinkje bij 'Indicatie fysiotherapie' "Ja" is aangevinkt.
- Er in de anamnesekaart een protocol is gekozen.
- De anamnesekaart is aangemaakt op/tussen de data die geselecteerd zijn bij periode.
- Optioneel: De anamnesekaart is aangemaakt door de geselecteerde fysiotherapeut.

Per geselecteerde anamnesekaart worden alle bijbehorende protocolonderdelen geselecteerd, die zijn afgerond en die een rapportage bevatten. Voor alle geselecteerde protocolonderdelen, wordt bekeken of er daadwerkelijk een rapportage is gemaakt binnen een periode van 7 dagen voor of na het afvinken van het protocolonderdeel.

Indien een protocolonderdeel binnen de laatste fase van het protocol valt, wordt de rapportage gezien als een eindrapportage. Indien anders, wordt de rapportage gezien als een tussentijdse rapportage.

## Meetinstrumenten / Vragenlijsten

Voor de berekening van de juiste meetinstrumenten / vragenlijsten, worden alle anamnesekaarten geselecteerd waarbij:

- In de anamnesekaart, het tabblad "Analyse", het vinkje bij 'Indicatie fysiotherapie' "Ja" is aangevinkt.
- Er in de anamnesekaart een protocol is gekozen.
- De anamnesekaart is aangemaakt op/tussen de data die geselecteerd zijn bij periode.
- Optioneel: De anamnesekaart is aangemaakt door de geselecteerde fysiotherapeut.

Per geselecteerde anamnesekaart, wordt er gekeken of er een vragenlijst en/of een meting is gedaan. Er wordt dus niet geteld hoeveel vragenlijsten en/of metingen er zijn gedaan, maar hoeveel anamnesekaarten er zijn waarbij er een of meerdere metingen/vragenlijsten zijn ingevuld.

## Overtime

Voor de berekening van de juiste overtime, worden alle anamnesekaarten geselecteerd waarbij:

- In de anamnesekaart, het tabblad "Analyse", het vinkje bij 'Indicatie fysiotherapie' "Ja" is aangevinkt.
- Er in de anamnesekaart een protocol is gekozen.
- De anamnesekaart is aangemaakt op/tussen de data die geselecteerd zijn bij periode.



- De Indicatie afgerond is.
- Optioneel: De anamnesekaart is aangemaakt door de geselecteerde fysiotherapeut.

Voor alle geselecteerde anamnesekaarten, waarbij de huidige week groter is dan het geplande aantal weken van het gekozen protocol en het veld overtime in de anamnesekaart niet gelijk is aan een lege tekst, is de overtime voldoende.

### **Dagjournaal**

Voor de berekening van de juiste dagjournaals, worden alle anamnesekaarten geselecteerd waarbij:

- In de anamnesekaart, het tabblad "Analyse", het vinkje bij 'Indicatie fysiotherapie' "Ja" is aangevinkt.
- Er in de anamnesekaart een protocol is gekozen.
- De anamnesekaart is aangemaakt op/tussen de data die geselecteerd zijn bij periode.
- Optioneel: De anamnesekaart is aangemaakt door de geselecteerde fysiotherapeut.

Per geselecteerde anamnesekaart, worden alle bezoeken geselecteerd.

Het dagjournaal totaal is gelijk aan het aantal geselecteerde anamnesekaarten.

Als 1 van de 3 bezoeken een journaaltekst heeft van meer dan 30 karakters, is het dagjournaal voldoende.